

Thème : raisonnement

L'exercice

À tout réel m , on associe la droite \mathcal{D}_m d'équation :

$$(2m - 1)x + (5 - m)y - 4m - 7 = 0.$$

- 1 – Montrer qu'il existe un point K appartenant à toutes les droites \mathcal{D}_m .
- 2 – (a) Déterminer m pour que \mathcal{D}_m passe par le point $A(1; 1)$.
(b) Si l'on se donne un point P du plan, existe-t-il toujours un nombre réel m tel que \mathcal{D}_m passe par le point P ?

Les productions de deux élèves de première S**Élève 1**

Avec un logiciel de géométrie, j'ai construit la figure avec un curseur pour le paramètre m . En faisant varier m , je vois que :

1. *Toutes les droites \mathcal{D}_m passent par le point $K(3; 2)$.*
2. (a) *Avec $m = -1$, \mathcal{D}_m passe par le point A .*
(b) *Quand m varie, la droite \mathcal{D}_m balaie tout le plan donc on peut atteindre tous les points du plan.*

Élève 2

1. *Si $m = 0$, la droite \mathcal{D}_0 a pour équation $-x + 5y - 7 = 0$.
Si $m = 5$, la droite \mathcal{D}_5 a pour équation $9x - 27 = 0$.
Les coordonnées du point d'intersection des deux droites vérifient le système*

$$\begin{cases} -x + 5y - 7 = 0 \\ 9x - 27 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$$

Donc toutes les droites \mathcal{D}_m passent par le point $K(3; 2)$.

2. (a) *On remplace les coordonnées de A dans l'équation \mathcal{D}_m et on obtient $m = -1$.*
(b) *Si on fait comme dans la question précédente, on obtient une valeur de m donc il existe toujours un nombre m tel que \mathcal{D}_m passe par le point P .*

Les questions à traiter devant le jury

- 1 – Analyser la réponse des deux élèves en mettant en évidence leurs réussites ainsi que leurs éventuelles erreurs. Vous préciserez l'accompagnement que vous pouvez leur proposer.
- 2 – Présenter une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de première S.
- 3 – Proposer deux exercices, un au niveau lycée et un au niveau collège, qui illustrent différents types de raisonnements utilisés en mathématiques.