
SOLUTIONS DE L'INTERROGATION

30 mars 2017

[durée : 1 heure]

Exercice 1

L'oral d'un concours comporte au total 100 sujets; les candidats tirent au sort trois sujets différents et choisissent alors le sujet traité parmi ces trois sujets. Un candidat se présente en ayant révisé 70 sujets sur les 100.

- a) Déterminer la probabilité pour que le candidat ait révisé :
- (i) les trois sujets tirés ;
 - (ii) aucun des trois sujets.
- b) Soit la variable aléatoire $X =$ « nombre de sujets révisés par le candidat parmi les 3 sujets tirés au sort ».
- (i) Déterminer la loi de X . (*On pourra identifier une loi connue.*)
 - (ii) En déduire la probabilité pour que le candidat ait révisé deux des sujets tirés.
Le résultat doit être donné sous forme d'une fraction irréductible.

Solution :

a) Soit $\llbracket 1; 100 \rrbracket$ l'ensemble des questions numérotées de 1 à 100. On considère l'univers $\Omega = \{M \in \mathcal{P}(\llbracket 1; 100 \rrbracket) \mid \#M = 3\}$ des parties à 3 éléments avec l'équiprobabilité. Ainsi nous avons $\#\Omega = C_{100}^3$.

(i) Le nombre de configurations avec 3 sujets révisés est C_{70}^3 . Ainsi

$$P(\text{« trois sujets révisés »}) = \frac{C_{70}^3}{C_{100}^3} = \frac{70.69.68}{100.99.98} = \frac{17.23}{3.5.7.11} = \frac{391}{1155}.$$

(ii) Le nombre de configurations avec 3 sujets non révisés est C_{30}^3 . Ainsi

$$P(\text{« aucun sujet révisé »}) = \frac{C_{30}^3}{C_{100}^3} = \frac{30.29.28}{100.99.98} = \frac{29}{3.5.7.11} = \frac{29}{1155}.$$

b) Soit la variable aléatoire $X =$ « nombre de sujets révisés par le candidat ».

- (i) Comme il s'agit de compter le nombre de « succès » lors de tirages sans remise, on remarque que X suit une loi hypergéométrique : $X \sim M(100, 70, 3)$. Ainsi $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ avec

$$P(X = k) = \frac{C_{70}^k C_{30}^{3-k}}{C_{100}^3} \quad \text{pour } k \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

- (ii) Nous avons

$$P(\text{« deux sujets révisés »}) = P(X = 2) = \frac{C_{70}^2 C_{30}^1}{C_{100}^3} = \frac{70 \cdot 69 \cdot 30}{100 \cdot 99 \cdot 98} = \frac{23}{2 \cdot 7 \cdot 11} = \frac{23}{154}.$$

Exercice 2

Un serveur brise en moyenne trois verres et une assiette par mois. Notons V le nombre de verres cassés et A le nombre d'assiettes cassées par un serveur. On suppose que V et A sont indépendantes et suivent des lois de Poisson de paramètres respectifs 3 et 1. Soit Z le nombre total de verres et d'assiettes cassés par mois par ce même serveur.

- Exprimer Z en fonction de V et de A .
- Calculer les probabilités $P(Z = 0)$, $P(Z = 1)$ et $P(Z = 2)$.
- Pour $k \in \mathbb{N}$, calculer $P(Z = k)$. Quelle loi connue suit la variable Z ?
- Un serveur est caractériel : si à la fin du mois il n'a pas cassé trois verres, il fête cela en brisant des verres pour arriver au minimum de 3 verres cassés dans le mois. On note W la variable qui compte le nombre de verres cassés par ce serveur particulier. Donner la loi de W .

Solution :

- D'après la définition de Z nous avons $Z = V + A$.

Dans la suite on utilise l'indépendance de V et A pour écrire

$$P(V = i, A = j) = P(V = i)P(A = j) = \left(e^{-3} \frac{3^i}{i!}\right) \left(e^{-1} \frac{1^j}{j!}\right) = e^{-4} \frac{3^i}{i!j!}.$$

- Nous avons

$$P(Z = 0) = P(V = 0, A = 0) = P(V = 0)P(A = 0) = e^{-3}e^{-1} = e^{-4},$$

$$P(Z = 1) = P(V = 1, A = 0) + P(V = 0, A = 1) = (e^{-3}3)(e^{-1}) + (e^{-3})(e^{-1}) = e^{-4}4,$$

$$P(Z = 2) = P(V = 2, A = 0) + P(V = 1, A = 1) + P(V = 0, A = 2)$$

$$= \left(e^{-3} \frac{3^2}{2!}\right)(e^{-1}) + (e^{-3}3)(e^{-1}) + (e^{-3})(e^{-1} \frac{1^2}{2!}) = e^{-4} \left(\frac{9}{2} + 3 + \frac{1}{2}\right) = e^{-4}8.$$

c) Comme $Z = k$ si et seulement si $V = i$, $A = k - i$ avec $i \in \{0, 1, \dots, k\}$, nous avons

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(V = i, A = k - i) = \sum_{i=0}^k \left(e^{-3} \frac{3^i}{i!} \right) \left(e^{-1} \frac{1^{(k-i)}}{(k-i)!} \right) \\ &= \sum_{i=0}^k e^{-4} \frac{3^i 1^{(k-i)}}{i!(k-i)!} = \frac{e^{-4}}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} 3^i 1^{(k-i)} = e^{-4} \frac{4^k}{k!}. \end{aligned}$$

On constate que Z suit la loi de Poisson avec paramètre $\lambda = 4$.

d) D'après l'énoncé

$$W = \begin{cases} 3 & \text{si } V \leq 3 \\ V & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ainsi $W \in \{3, 4, 5, \dots\}$ avec $P(W = 3) = P(V = 0) + P(V = 1) + P(V = 2) + P(V = 3) = e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} \right) = e^{-3} 13$, et pour $k \geq 3$, $P(W = k) = P(V = k) = e^{-3} \frac{3^k}{k!}$.